



Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web [www.connecticutgi.org](http://www.connecticutgi.org)

## Preparación para el procedimiento PLENVU

*\*Siga estas indicaciones. **NO siga las instrucciones de la caja.**\**

**\*La receta para su preparación se ha enviado a su farmacia de forma electrónica. Por favor, retirar dentro de una semana.**

- **Debe seguir una dieta de líquidos claros 30 horas antes de su procedimiento (revise la hoja de la dieta de líquidos claros).**
- **No debe recibir nada por vía oral durante las 4 horas previas a su procedimiento, INCLUIDOS chicles y caramelos duros.**

NOTA: Si no se purga correctamente el colon, se puede cancelar el procedimiento.

*El Colegio Americano de Gastroenterólogos recomienda dividir la preparación para la visualización óptima del colon y la detección de pólipos pequeños y cáncer.*

El envase de Plenvu contiene 3 sobres y un recipiente desechable para mezclar. Hay un sobre con la etiqueta Dosis 1, y para la Dosis 2 hay dos sobres más pequeños con la etiqueta "«A y B». Debe completar toda la preparación para garantizar la limpieza efectiva.

### **EL DÍA ANTES DE SU COLONOSCOPIA**

#### **DIETA LÍQUIDA CLARA**

- Entre las 6 y las 7 p.m. de la noche anterior, tome la dosis 1 (un solo sobre grande con la etiqueta Dosis 1).
- Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la dosis 1 con al menos 450 ml de agua agitando o usando una cuchara hasta que esté completamente disuelto. Esto puede llevar entre 2 y 3 minutos (si lo prefiere, puede mezclar la solución con anticipación y refrigerarla antes de beberla).
- **TOME SU TIEMPO.** Termine la dosis **LENTAMENTE** en 30 minutos.
- Beba 450 ml del líquido claro de su elección.  
(Por favor evite líquidos claros con mayores cantidades de sodio, por ejemplo: caldo de pollo y ternera)

### **5 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO**

- **5 horas antes de la hora programada para su procedimiento,** tome la dosis 2.
- Tome la dosis 2 (sobres más pequeño A y B pegados juntos). Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la dosis 2 (sobre A y sobre B) con al menos 450 ml de agua agitando o usando una cuchara hasta que esté completamente disuelto. Esto puede tomar 2-3 minutos.
- **TOME SU TIEMPO.** Termine la dosis **LENTAMENTE** en 30 minutos o puede causar náuseas y vómitos.
- Beba 450 ml del líquido claro de su elección.  
(Por favor evite líquidos claros con mayores cantidades de sodio, por ejemplo: caldo de pollo y ternera)

*La diarrea puede continuar durante varias horas después de que termine de beber la solución*